

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

KOLONOSKOPIA

Trzy dni przed badaniem

Zaleca się przez 3 dni przed planowanym badaniem **nie spożywać**:

- owoców pestkowych, pestek siemienia lnianego,
- tłustych mięs i wędlin,
- sałatek i warzyw,
- napojów gazowanych.

Należy natomiast pozostawać na diecie półpłynnej. Można spożywać:

- zmiksowane zupy,
- kisiele, budynie, serki homogenizowane, kleiki,
- ryż, makaron,
- mięso gotowane, ryby,
- klarowne, niegazowane napoje.

W dniu badania

Jeżeli badanie odbywa się w godzinach porannych, to po godzinie 16 w dniu poprzedzającym badanie należy rozpuścić 4 saszetki preparatu Fortrans w 4 litrach wody niegazowanej. Roztwór należy wypić w ciągu 6 godzin. Od chwili wypicia preparatu Fortrans nie wolno przyjmować żadnych pokarmów. Można pić dowolną ilość wody niegazowanej oraz herbaty z cukrem do 4 godzin przed planowanym badaniem. Nie należy żuć gumy ani palić papierosów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon:

22 636 47 74

E-mail:

przychodnia@multimed.pl

PRZYCHODNIE MULTIMED W WARSZAWIE

Okopowa 33

01-059 Warszawa

Grochowska 234/240

04-368 Warszawa

Waryńskiego 6

00-631 Warszawa

Pólna 3

00-622 Warszawa

PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Al. Stanów Zjednoczonych 51

04-028 **Warszawa**

Krasińskiego 69

01-755 **Warszawa**

Lubelska 50

08-400 **Garwolin**

Sienkiewicza 7

09-100 **Płońsk**

Andersa 2

22-600 **Tomaszów Lubelski**

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

Jeżeli badanie odbywa się w godzinach popołudniowych lub wieczornych, to w dniu poprzedzającym badanie w godzinach 18-20 należy rozpuścić 2 saszetki preparatu Fortrans w 2 litrach wody niegazowanej. Roztwór należy wypić w ciągu 4 godzin. Kolejne 2 saszetki preparatu Fortrans w dniu badania należy rozpuścić w 2 litrach wody niegazowanej i skończyć pić 4 godziny przed planowanym badaniem. Od chwili wypicia preparatu Fortrans nie wolno przyjmować żadnych pokarmów. Można pić dowolną ilość wody niegazowanej oraz herbaty z cukrem do 4 godzin przed planowanym badaniem. Nie należy żuć gumy ani palić papierosów.

UWAGA!

Prawidłową reakcją na zastosowanie preparatu Fortrans świadczącą o odpowiednim przygotowaniu do badania jest wypróżnienie treścią płynną w kolorze żółtawym.

Osoby z cukrzycą powinny przed badaniem skonsultować się ze lekarzem diabetologiem.

Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi powinny skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym.

Jeżeli badanie jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym, to wskazane jest stawienie się na badanie z osobą towarzyszącą. Po badaniu nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Leki stosowane przewlekłe należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon:
22 636 47 74

E-mail:
przychodnia@multimed.pl

PRZYCHODNIE MULTIMED W WARSZAWIE

Okopowa 33
01-059 Warszawa

Grochowska 234/240
04-368 Warszawa

Waryńskiego 6
00-631 Warszawa

Poła 3
00-622 Warszawa

PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 **Warszawa**

Krasińskiego 69
01-755 **Warszawa**

Lubelska 50
08-400 **Garwolin**

Sienkiewicza 7
09-100 **Płońsk**

Andersa 2
22-600 **Tomaszów Lubelski**